

## بررسی شیوع سنی و جنسی و لوکالیزاسیون آدنوکارسینوم کولورکتال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فاطمی اردبیل از سال ۸۳ تا ۸۸

سمیرا متین، دکتر مهدی چینی فروش، امین باقری، المیرا متین

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل



دومین کنفرانس پژوهشی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی غرب کشور  
دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنج ۲۱-۱۹ آبان ۱۳۸۹



- **مقدمه و هدف:** سالیانه تقریباً ۵۰۰۰۰ مورد جدید سرطان در ایران بروز می نماید. آدنوکارسینوم کولورکتال در مردان ایرانی رتبه سوم و در زنان رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است. بر اساس گزارش ثبت سرطان مبتنی بر جامعه ی استان اردبیل سرطان کولورکتال چهارمین سرطان شایع در میان مردان و پنجمین سرطان شایع در میان زنان این استان می باشد. هدف از این تحقیق بررسی فراوانی بیماران از نظر سنی و جنسی، محل زندگی، شکایت بیمار هنگام مراجعه و محل ضایعه است.
- **مواد و روشها:** این مقاله یک مطالعه ی گذشته نگر توصیفی مقطعی است که در آن پرونده کلیه بیمارانی که از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ در بیمارستان فاطمی اردبیل با تشخیص آدنوکارسینوم کولورکتال بستری شده بودند مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.
- **نتایج:** تعداد کل بیماران ۵۸ نفر بودند که از این تعداد ۳۱ نفر زن (۵۳/۴٪) و ۲۷ نفر مرد (۴۶/۶٪) بودند. از نظر توزیع سنی بیشترین محدوده سنی با ۳۷ نفر (۶۳/۷٪) در بازه ی (۶۸-۷۸) سال و کمترین محدوده سنی با ۴ نفر در بازه ی (۱۸-۲۸) سال بودند. میانگین سنی آنها ۵۸/۹ بدست آمد. از نظر فراوانی محل ضایعه حدود ۳۱ مورد (۵۳/۴٪) در رکتوم و کمترین محل درگیری در کولون صعودی با ۲ مورد (۳/۴٪) بود. از بیماران مورد بررسی فقط ۲۰ مورد (۳۴/۵٪) سابقه ی مصرف سیگار داشتند. از لحاظ محل سکونت ۳۴ مورد (۵۸٪) ساکن روستا و ۲۴ نفر (۴۲٪) ساکن شهر بودند. از نظر شکایت بیمار هنگام مراجعه بیشترین مورد رکتورژی با ۷۲٪ بود.
- **بحث و نتیجه گیری:** نتایج اماری با نرم افزار spss تحت آنالیز قرار گرفت که در این آنالیز بین سن و بیماری رابطه ی معنا داری با  $p=0.00$  یافت شد. بین محل ضایعه و شکایت اصلی بیمار نیز رابطه ی معنا داری با  $p=0.001$  یافت شد.
- **واژگان کلیدی:** کولورکتال، آدنوکارسینوم